

VRAAG HET WIEUWIE

1

IK HEB EEN *HIBISCUS GRANDE* MET UITZONDERLIJK GROTE BLOEMEN IN EEN GROTE BLOEMBAK STAAN. VOLGEND VOORJAAR WIL IK DEZE PRACHTIGE PLANT IN DE VOLLEGROND PLANEN. WANNEER EN HOE MOET IK DEZE HIBISCUS DAN SNOEIEN?

Over hibiscus met grote bloemen bestaat veel verwarring wat betreft de naamgeving. Heb je *Hibiscus fiori grande* dan kun je deze niet in de vollegrond planten. Het gaat hier om een kuipplant die je vorstvrij moet overwinteren. Maar heb je *Hibiscus moscheutos* (moerashibiscus) - ook verkrijgbaar als *Hibiscus newbiscus* 'XXL' vanwege zijn 20-25 cm grote bloemen - dan is het een ander verhaal. Dit is namelijk een vaste plant die elk voorjaar weer opkomt. Deze soort kun je prima in de border planten. In maart-april hoef je alleen de afgestorven plantstengels af te knippen. Plant deze moerashibiscus wel in goede grond en op een warme, zonnige plek. Liefst vlak bij een zuidmuur; de stenen houden de warmte vast om deze 's nachts weer af te geven. Voor deze beauty geldt namelijk, hoe warmer de nachten, hoe groter de bloemen!



2

IK DACHT DAT *PHOTINIA* EEN MAKKELIJKE STRUIK WAS MAAR BIJ ONS DOET HIJ HET AL JAREN ERG SLECHT. HIJ IS ERG KAAL EN VEEL BLADEREN HEBBEN GROTE ROODBRUINE VLEKKEN. WAT IS ER AAN DE HAND?

Hoewel *Photinia* (glansmispel) het vrijwel overal goed doet, kan hij soms toch veel blad laten vallen. Dat gebeurt vooral als het langdurige droog is. Door bladeren af te stoten, verdampt de plant minder vocht; een goede overlevingsstrategie dus! Hoewel *Photinia* goed winterhard is, houdt hij niet van koude wind. Ook dan kan deze bladhoudende heester - vooral in een koude winter - veel blad verliezen. Een enigszins beschutte plek is daarom aan te raden. Een kale, oude *Photinia* kun je gelukkig nog wel oplappen door hem in het vroege voorjaar flink terug te snoeien; dan ontstaat er al snel weer jong, fris groen. Breng daarnaast rond de voet van de plant compost aan en wat organische mest, en geef hem in een droge zomer af en toe flink wat water. Al na 1-2 jaar heb je waarschijnlijk weer een mooie *Photinia*!

3

DE *SKIMMIA* IN ONZE VOORTUIN WORDT ALSMAAR BREDER EN GROEIT NU TE VEEL OVER HET PAD. KAN IK HEM SNOEIEN EN ZO JA, WANNEER?

Skimmia heeft een mooie ronde groei-vorm. Snoei je hem alleen aan de kant van het pad, dan verpest je die vorm volledig. Volstaat een lichte snoei om het pad enigszins vrij te maken, dan zou je alleen de jonge groei eraf kunnen knippen. Dit moet je dan wel elk voorjaar herhalen. Snoei je *skimmia* op deze manier, doe dat dan uiterlijk in juni. Wil je het wat rigoureuzer aanpakken? Vouw de plant dan open en kijk of je onderin nieuwe scheuten ziet. Je kunt de *skimmia* dan in maart-april terug snoeien tot 10-15 cm boven de grond, dan heeft hij nog een heel seizoen om mooi uit te lopen. Zelf zou ik het trouwens best aandurven om de *skimmia* ook zónder deze uitlopers flink aan te pakken! Grote kans dat hij toch wel weer uitloopt. Vergeet niet om de struik na deze rigoureuze snoei meteen wat mest te geven. Zorg ook dat hij de eerste maanden voldoende water krijgt.





4

MIJN MOESTUIN BEMEST IK ELK JAAR MET SAMENGESTELDE ORGANISCHE MEST, DAARNAAST VOEG IK OOK FLINK WAT COMPOST TOE. IK PLANT ALTIJD ZO VROEG MOGELIJK PLANTUITJES; IK DENK ZO EEN VOORSPRONG TE HEBBEN OP ZAAIUITJES EN HEB BOVENDIEN GEEN LAST VAN DE UIENVLIEG. MAAR ALS IK NU LANGS DE VELDEN LOOP, DAN VALT HET ME OP DAT DE GEZAAIDE UIEN VAN DE AKKERBOUWERS EEN STUK GROTER ZIJN DAN DE MIJNE. HOE DOEN ZE DAT?

Uien kun je inderdaad planten en zaaien. De plantuien worden als kleine bollen geleverd, deze kun je van half februari tot half april uitplanten. Het doel om vroeg te planten is om ook al vroeg te kunnen oogsten. Plantuien verdragen vorst, het is zelfs mogelijk om ze al in de herfst te planten, zo tussen september en half november. Het voordeel is dat je dan nóg enkele weken eerder kunt oogsten. Plantuitjes planten is makkelijker en gaat sneller dan zelf uien zaaien. Veel moestuiniers gaan daarom voor deze optie.

Je geeft aan dat de bollen wat achter blijven in de groei. Ik zou niks veranderen aan het moment en de manier van planten. Wellicht komt de achterstand door een tekort aan kali. Deze meststof zorgt voor een goede ontwikkeling van de bol. Vraag bij aanschaf van de kali wanneer je deze het beste kunt strooien, meestal is dat 6-8 weken vóór het oogsten.

5

VORIGE MAAND ZIJN WE VERHUID NAAR EEN HUIS MET EEN GROTE TUIN. NU ZIE IK IN EEN VERWILDERD HOEKJE INEENS ORANJE BESSEN AAN STENGELS DIE ZO UIT DE GROND LIJKEN TE KOMEN. WAT IS DIT?

Dit is Italiaanse aronskelk (*Arum italicum*), een leuke plant – in feite een bolgewas – die je niet zoveel ziet. Hij wordt beschouwd als een stinsenplant; in vroeger tijden werd hij in ons land op buitenplaatsen aangeplant waar hij verwilderde. Omdat Italiaanse aronskelk zich zo makkelijk uitbreidt, is hij niet voor elke tuin geschikt. Hij houdt van een goed doorlatende, vochtige, humusrijke grond en van (half) schaduw, je ziet hem daarom vaak onder loofbomen staan. In het voorjaar verschijnen de mooie, grote, pijlvormige bladeren. De bloei in april-mei valt niet erg op; deze bestaat uit een bloeikolf, omgeven door een groenwit schutblad. Na de bloei sterven de bladeren af, de plant trekt zich dan grotendeels ondergronds terug. De bessen vallen pas op als ze oranje zijn gekleurd, dat is vanaf juli. Pas wel op want de bessen zijn erg giftig, net zoals de rest van de Italiaanse aronskelk.



6



VIJF WEKEN GELEDEN ONTDEKTE IK ENGERLINGEN IN MIJN TUIN. IK PROBEER ZE NU MET AALTJES TE BESTRIJDEN. MAAR LAS DAT DIE ALLEEN GOED WERKEN TEGEN DE KLEINE LARVEN. DE ENGERLINGEN IN MIJN TUIN ZIJN 5-6 CM GROOT EN ZITTEN ER MOGELIJK AL DRIE JAAR. GEEN WONDER DAT ZOVEEL PLANTEN HET LOODJE HEBBEN GELEGD! BIJNA ALLE PLANTEN HEB IK NU IN POTTEN GEZET OM TE VOORKOMEN DAT OOK HUN WORTELS WORDEN AANGEVRETEN. MAAR INMIDDELS ZIJN ZE OOK BEGONNEN AAN DE WORTELS VAN MIJN 25 JAAR OUDE JAPANESE ES-DOORN. IK BEN TEN EINDE RAAD. HOE KOM IK VAN DEZE PLAAG AF?

Engerlingen is de verzamelnaam van de larven van diverse keversoorten, zoals de meikever. Deze vreten aan de wortels en kunnen veel schade geven. Bestrijden met aaltjes ofwel nematoden lost het probleem meestal niet in één keer op. Ook het tijdstip van toepassing speelt een rol. Verder bepalen het soort kever en de weersomstandigheden hoe lang de larven onder de grond blijven. Dit kan variëren van één tot drie jaar. In het algemeen geven leveranciers van nematoden aan dat bestrijding moet plaatsvinden vanaf half april tot en met oktober, soms twee keer per jaar. De grondtemperatuur mag niet lager zijn dan 10 °C. Er is dus geduld nodig, soms moet je er enkele jaren voor uittrekken. Onze hoveniers maken met succes gebruik van aaltjes. Lukt de bestrijding niet, dan kun je hiervoor altijd een Tuinkeur hovenier vragen.

LIEUWE WESTRA, TUINADVISEUR BIJ TUINKEUR, BEANTWOORDT IN DEZE RUBRIEK VRAGEN VAN LEZERS. HEB JE EEN TUIN-VRAAG? MAIL DEZE NAAR REDACTIE.TUIN@VIPMEDIA.NL O.V.V. VRAAG HET LIEUWE.

